

貯法：室温保存
有効期間：ポリ容器：4年
ブリキ缶：3年

許可番号 13A2X00114

販売開始 1949年11月

軟膏基剤

日本薬局方 白色ワセリン

White Petrolatum

3. 組成・性状

3.1 組成

成分	1g中 日局 白色ワセリン 1g
添加剤	1g中 ジブチルヒドロキシトルエン（抗酸化剤） 0.01mg

3.2 製剤の性状

性状	白色～微黄色の全質均等の軟膏様物質で、におい及び味はない。 水又はエタノール（95）にほとんど溶けない。 加温するとき、澄明な液となる。 融点 38～60℃
----	---

4. 効能又は効果

軟膏基剤として調剤に用いる。
また、皮膚保護剤として用いる。

6. 用法及び用量

軟膏基剤として調剤に用いる。
また、皮膚保護剤として用いる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
皮膚	接触皮膚炎

22. 包装

500g [ポリ容器]、15kg [ブリキ缶]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

小塚製薬株式会社 学術情報室
〒130-0026 東京都墨田区両国4-36-9
TEL：03-3631-1495 FAX：03-3631-1457

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

小塚製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9