

貯 法：室温保存  
有効期間：3年

承認番号 16000AMZ04489000  
販売開始 1949年11月

収れん・消炎・保護剤

日本薬局方 亜鉛華軟膏

## 亜鉛華軟膏「コザカイ・M」

Zinc Oxide Ointment

## 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

重度又は広範囲の熱傷には使用しないこと。[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。]

## 3. 組成・性状

## 3.1 組成

有効成分	100g中 日局 酸化亜鉛 20g
添加剤	流動パラフィン、サラシミツロウ、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、白色ワセリン

## 3.2 製剤の性状

性状	白色である。
----	--------

## 4. 効能又は効果

○下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐

外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門そう痒症、白癬、  
面皰、せつ、よう

○その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

## 6. 用法及び用量

通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦または貼布する。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、  
異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行  
うこと。

## 11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	過敏症状
皮膚	発疹、刺激感等

## 14. 適用上の注意

## 14.1 薬剤使用時の注意

眼には使用しないこと。

## 18. 薬効薬理

## 18.1 作用機序

局所の収れん、分泌物の減少などの作用を有する。酸化亜鉛の  
作用に加え、皮膚軟化性及び皮膚密着性を持ち、痂皮を軟化  
し、肉芽形成・表皮形成を促進させて皮膚疾患を改善する<sup>1)</sup>。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：酸化亜鉛（Zinc Oxide）

分子式：ZnO

分子量：81.38

性状：白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

水、エタノール（95）、酢酸（100）又はジエチルエー  
テルにほとんど溶けない。

希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。

空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

## 22. 包装

500g [ポリ容器]

## 23. 主要文献

1) 第十八改正日本薬局方解説書。廣川書店。2021：C-30-32

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

小塚製薬株式会社 学術情報室

〒130-0026 東京都墨田区両国4-36-9

TEL：03-3631-1495 FAX：03-3631-1457

## 26. 製造販売業者等

## 26.1 製造販売元

小塚製薬株式会社

東京都墨田区両国4-36-9